Koiran ja kissan ihon tukihoitotuotteet

Bakteerit ja hiivat

Yleistynyt bakteerien tai hiivojen ylikasvu

Peptivet® Shampoo + Peptivet® Foam
TAI
Clorexyderm® 4% Shampoo + Clorexyderm® 4% Liuos

Paikallinen voimakas bakteerien tai hiivojen ylikasvu
ihopoimuissa, tassuissa, vatsan alueella,
kainaloissa tai nivusissa

CLX Wipes ja/tai Peptivet® Foam
TAI
CLX Wipes ja/tai Clorexyderm® 4 % Liuos

Paikallinen lievä bakteerien tai hiivojen ylikasvu
ihopoimuissa, tassuissa, vatsan alueella,
kainaloissa tai nivusissa

CLX Wipes ja/tai Clorexyderm® Spot Gel

Rasvainen ja hilseilevä iho

Rasvainen turkki ja hilseilevä iho
- Ei bakteereita tai hiivoja

Zincoseb® Shampoo

Rasvainen turkki ja hilseilevä iho
- Lisäksi bakteereita tai hiivoja

Zincoseb® Shampoo + Clorexyderm® 4 % Liuos
TAI
Zincoseb® Shampoo + Peptivet® Foam

Kuiva, hilseilevä iho ja turkki

Yleistynyt punoitus, kutina ja kuivuus

Ermidra® Shampoo + Ermidra® Spray

Paikallinen punoitus, kutina ja kuivuus
- ihopoimuissa, tassuissa, vatsan alueella,
kainaloissa tai nivusissa

Ermidra® Spray

Kirurginen pesu

Ihon pesu ennen toimenpiteitä

Clorexyderm® 4 % Shampoo + Clorexyderm® 4 % Liuos

ICF Evolution of Knowledge
FaunaPharma
FaunaPharma Oy
PL 8 c/o Oriola Oy
02101 ESPOO
puh. 045 189 6144

Peptivet® Shampoo

Vaikutusaika 3-5 minuuttia.

Suositeltu käyttötiheys kahdesti viikossa ensimmäisen kahden viikon ajan, sen jälkeen kerran viikossa kahden viikon ajan.

Koostumus:
AMP2041 (peptidi), klooriheksidiinidiglukonaatti max 0,1%, Tris-EDTA, lanoliinietoksylaatti, amfoteeriset pinta-aktiiviset aineet, puhdistettu vesi

Peptivet® Vaahtoliuos

Tuotetta ei huuhdella iholta.

Käyttö kerran vuorokaudessa tai useammin. Shampoon kanssa yhdessä käytettäessä annostellaan shampoopesujen välipäivinä.

Koostumus:
AMP2041 (peptidi), klooriheksidiinidiglukonaatti max 0,07 %, Tris-EDTA, glyserofosfoinositolin lysiinisuola (GPI), propyleeniglykoli, glyseroli, puhdistettu vesi

Clorexyderm® Shampoo 4 %

Vaikutusaika 5-10 minuuttia.
Käyttö vähintään kahden viikon ajan.

Koostumus:
Klooriheksidiinidiglukonaatti 4 %, isodekyylialkoholietoksylaatti, propyleeniglykoli, glyseriini, dimetyylialkyylioksidi, etoksyloitu lanoliini, hydroksietyyliselluloosa, hajuste, turkoosi Kemazol, deionisoitu vesi

Clorexyderm® Liuos 4 %

Tuotetta ei huuhdella iholta.
Käyttö kerran päivässä.

Koostumus:
Klooriheksidiiniglukonaatti 4%, propyleeniglykoli, glyseriini, etoksyloitu lanoliini, rasva-alkoholietoksylaatti, deionisoitu vesi

Clorexyderm® Shampoo 4 % ja Liuos 4 % myös kirurgiseen pesuun:
Puhdista ihoalue Clorexyderm®-shampoolaimennoksella pyörivin liikkein keskeltä reunoille kahdesti ja pyyhi alue lopuksi keskeltä reunoille Clorexyderm®-liuoksella.

Ermidra® Shampoo

Vaikutusaika 5-6 minuuttia.
Käyttö aluksi 2-3 kertaa viikossa.

Koostumus:
Glykolinen salviauute, maitohorsmauute, anioninen surfaktantti, betaiini, sinkkiglukonaatti, maitoseerumi, säilöntäaine, hajuste, apuaineet, deionisoitu vesi

Ermidra® Spray

Tuotetta ei huuhdella iholta.
Voidaan käyttää useita kertoja päivässä.

Koostumus:
Maitohorsmauute, sinkkiglukonaatti, propyleeniglykoli, liposomit, glyseriini, hajuste-esanssit, syklodekstriinit, D-pantenoli, apuaineet, deionisoitu vesi

Zincoseb® Shampoo

Vaikutusaika muutama minuutti.
Käytetään tarvittaessa.

Koostumus:
Kationinen surfaktantti, betaiini, kookosdietanoliamidi, salisyylihappo, maitohappo, etoksyloitu lanoliini, kolloidinen rikki, sinkkiglukonaatti, klooriheksidiinidiglukonaatti, sakeutusaine, hajuste, deioinisoitu vesi

CLX Wipes

Desinfioiva puhdistuspyyhe iholle.
Käyttö kerran tai useammin päivässä.

Koostumus:
Klooriheksidiini 0,3 %, Tris-EDTA, sinkkiglukonaatti, demineralisoitu vesi, ei-ioninen surfaktantti, isopropanoli, propyleeniglykoli, glyseriini, klimbatsoli, hajuste

Clorexyderm® Spot gel

Tuotetta ei huuhdella iholta.
Käytetään tarvittavan ajan.

Koostumus:
Klooriheksidiiniglukonaatti (0,3 %), Tris-EDTA, lanoliini, glyseriini, sorbitoli, polyvinyylipyrrolidoni, deionisoitu vesi

04/2018